



Il Punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

Il R. ferrugineus, conosciuto anche come Punteruolo rosso delle palme, è un coleottero curculionide originario dell'Asia meridionale e ampiamente diffuso nell'Asia sud-orientale, nel nord Africa e in Europa. In Italia è stato segnalato in Toscana, Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Liguria, Abruzzo e Sardegna. Nel settembre 2007 sono stati catturati i primi esemplari nelle Marche.

Particolarmente colpite risultano le specie Phoenix canariensis e P. dactylifera.


SINTOMI E DANNI

La presenza del R. ferrugineus diviene evidente solo quando l'infestazione è giunta ad una fase molto avanzata. I primi sintomi sono rappresentati da una asimmetria verticale seguita da un abbassamento della corona apicale con l'assunzione del caratteristico aspetto a ombrello aperto. Nelle ultime fasi dell'attacco la palma appare come "capitozzata".



MISURE DI CONTROLLO

- Monitoraggio della presenza di R. ferrugineus;*
- Individuazione delle zone infestate;*
- Abbattimento e distruzione delle piante colpite;*
- Trattamenti preventivi delle piante nelle zone infestate;*
- Divieto di spostamento delle piante sensibili nelle aree infestate;*
- Potatura delle sole parti secche evitando il taglio di foglie verdi, disinfezione delle ferite ed eliminazione del materiale di potatura;*
- Comunicare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di palme con sintomi sospetti.*



Eventuali casi sospetti vanno segnalati a:

Servizio Fitosanitario Regionale
via Alpi 21,
60131 Ancona
Telefono 071 8081
Fax 071 85979
e-mail: fit@assam.marche.it